NITA-FARM®
ветеринарная фармацевтика

ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ
ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ

ТУЛАТРИН®

НОВИНКА

Тулатромицин 10%
Раствор для инъекций

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ СВЕРХПРОЛОНГИРОВАННЫЙ МАКРОЛИД
НА ОСНОВЕ ТУЛАТРОМИЦИНА ДЛЯ КОНТРОЛЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У КРС И СВИНЕЙ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

Тулатрин®





ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимум эффективности при метафилактике
- Одна инъекция - весь курс применения
- Период защиты до 15 дней
- Высокая концентрация в легких

ОПИСАНИЕ

Первый российский сверхпролонгированный макролид на основе 10%-го тулатромицина для контроля бактериальных инфекций органов дыхания у КРС и свиней с первых дней жизни.

Тулатрин® по внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Препарат выпускают расфасованным по 100 мл в стеклянные флаконы, которые допускается упаковывать в индивидуальную упаковку.

СОСТАВ

1 мл ТУЛАТРИН = 100 мг тулатромицина

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ (БИОЛОГИЧЕСКИЕ) СВОЙСТВА

Тулатрин® – антибактериальный лекарственный препарат, относится к группе макролидов.


Тулатромицин – действующее вещество препарата – обладает широким спектром действия в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе и в отношении Pasteurella spp., Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus spp., Haemophilus somnus, Haemophilus parasuis, Mycoplasma spp., Mycoplasma bovis, Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma bovigenitalium, Actinobacillus spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Moraxella spp., Moraxella bovis, Neisseria spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus, Bordetella spp., Bordetella bronchiseptica, Enterococcus spp., Enterococcus faecalis, Enterobacter spp., Enterobacter agglomerans.

Механизм бактериостатического действия тулатромицина основан на подавлении белкового синтеза на рибосомальном уровне.
Тулатромицин быстро всасывается из места инъекции, достигая пика концентрации в плазме крови через 30 минут после введения, и медленно выводится из организма. Препарат накапливается в нейтрофилах и альвеолярных макрофагах, в результате чего достигается повышенная концентрация тулатромицина в легких.


ЗАЩИТА ОТ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ КРС

После однократной инъекции Тулатрин® способен обеспечивать высокую терапевтическую концентрацию в легочной ткани более чем 15 дней. При этом его концентрация в средостенных лимфоузлах у крупного рогатого скота даже на 19-й день после инъекции находится на уровне, превышающем минимальную ингибирующую концентрацию для основных респираторных патогенов в несколько раз.

Концентрация тулатромицина в легочной ткани после инъекции препарата Тулатрин®



Концентрация тулатромицина в средостенных лимфоузлах на 19-й день после инъекции препарата Тулатрин®



МИК основных респираторных патогенов

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Тулатрин® назначают:

- крупному рогатому скоту для лечения бактериальных инфекций, вызываемых Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus и Mycoplasma bovis, Mycoplasma bovigenitalium, Enterococcus faecalis, Enterobacter agglomerans, Staphylococcus aureus, инфекционного кератоконъюнктивита, вызываемого Moraxella bovis, Neisseria spp., и других заболеваний, возбудители которых чувствительны к тулатромицину;
- свиньям при бактериальных инфекциях, вызываемых Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Streptococcus spp., и других заболеваний, возбудители которых чувствительны к тулатромицину;
- в целях предотвращения распространения заболеваний допускается назначение препарата в терапевтической дозе группе животных, контактирующей с больным животным и не имеющей клинических признаков заболевания.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВИД ЖИВОТНОГО	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗИРОВКА	КУРС ПРИМЕНЕНИЯ
КРС	Подкожно	1мл/40 кг массы тела животного	Однократно
Свинья	Внутримышечно		

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применять Тулатрин® животным при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата, а также дойным коровам, молоко которых используют в пищевых целях.

Препарат запрещается применять стельным коровам и телкам менее чем за 2 месяца до ожидаемого срока отела, если молоко планируется использовать в пищевых целях. Возможность применения препарата самкам в период беременности и вскармливания приплода определяет лечащий ветеринарный врач на основании оценки отношения пользы к возможному риску применения препарата.

В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

Тулатрин® не рекомендуется применять одновременно с другими макролидами и линкозамидами, а также смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ОГРАНИЧЕНИЯ

49 суток - КРС*
33 суток - СВИНЬИ

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки - 28 суток.

* При условии зачистки (выбраковки) места инъекции (диаметр 15 см, глубина 2,5 см). При отсутствии возможности определения точной локализации места инъекции, убой крупного рогатого скота разрешается не ранее 55 суток после применения препарата.

NITA-FARM®
ветеринарная фармацевтика

ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ
ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ

НИТА-ФАРМ – КЛЮЧЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ РОССИИ

30+
ЛЕТ НА РЫНКЕ

Good Manufacturing Practice Certification
GMP Quality

22
ПАТЕНТОВАННЫХ ПРОДУКТА

МЫ – ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

ВСЕ О НОВИНКАХ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

САЙТ
WWW.NITA-FARM.RU

ВКОНТАКТЕ
@nitafarm

ТЕЛЕГРАМ
@nita_farm

MAX
@nitafarm